

Is deze mail niet goed leesbaar? Surf dan naar de [online versie](#)

VARKENSLOKET

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019

Agenda

Piétrainfokkerij in een nieuwe dimensie

4 november - Tielt

5 november - Beervelde

7 november - Bocholt

[Meer info](#)

14 november 2019

Debat 'klimaatslimme voeding'

Campus VIVES-Kortrijk

[Meer info](#)

Nieuw op www.varkensloket.be

Studienamiddag kwalitatief biggen grootbrengen


Concrete tips en tricks om biggen op een kwalitatieve wijze groot te brengen. Een 250-tal stakeholders namen hiervoor op 25 september deel aan onze studienamiddag in Aalter.

[Bekijk de hand-outs en belangrijkste conclusies.](#)

Kiezen voor Belgische Piétrain, Franse Piétrain of Canadese Duroc?

Vleesvarkens afkomstig van een Canadese Duroc geven de beste vleeskwiteit, gevolgd door de stressnegatieve Franse Piétrain en tenslotte de Belgische Piétrain. Als varkenshouder is het evenwel het meest rendabel om de Belgische Piétrain als eindbeer te gebruiken. Bij een andere eindbeerkeuze moet je een meerprijs realiseren om de hogere voederkost, het lagere karkasrendement en het lagere vleespercentage te compenseren.

Lees het [artikel](#).



Zout in biggenvoeder: mag het een beetje meer of minder zijn?



Recent onderzoek uit de V.S. suggereert dat de zoutconcentraties in speenvoeders de eerste weken na het spenen best worden verhoogd. Ook de voedersamenstelling, waaronder het eiwitgehalte (hoger in de V.S.) verschilt tussen België en de V.S.. Geldt de aanpassing van de zoutnormen dus ook voor Vlaanderen? Uit een ILVO-proef met verschillende zout- en eiwitgehalten blijkt dat het niet aangewezen is om de zoutgehalten van de huidige speenvoeders op te trekken. Variërende zoutgehalten (1,9 tot 3,9 g/kg) in speenvoeder lijken de groeiprestaties niet te beïnvloeden. Hogere zoutconcentraties gaven slappere mest. Lees het [artikel](#).

(Gestandaardiseerde) karkasgroei per kg voeder

Het ontbreken van een uniforme berekening voor de voederconversie maakt het voor varkenshouders moeilijk om in te schatten of ze goed bezig zijn. Samen met de sector gingen ILVO en UGent daarom op zoek naar een uniforme berekeningswijze. Een [tool](#) laat je toe om de karkasgroei per kg voeder en gestandaardiseerde karkasgroei per kg voeder te berekenen. Je vult hiervoor 6 gegevens in: het gemiddeld opleggewicht van de biggen, het aantal opgelegde biggen, het aantal afgeleverde varkens, de totale hoeveelheid voeder verbruikt tijdens de afmestperiode, de afmestduur en het gemiddeld karkasgewicht (warm of koud).

Lees ook het [artikel](#).

Testwerking: voederconversie- en groeiresultaten online

Welk eindbeersperma levert de beste biggenkwaliteit, vleesvarkensgroei, voederconversie en karkaskwaliteit? Via de onafhankelijke [ILVO testwerking](#) kan je de prestaties van geteste eindberen van diverse genetica (momenteel VPF, RaSE genetics en AWE) met elkaar vergelijken. Lees het [artikel](#).

Vraag-antwoord

- [Binnenkort wordt het kopergehalte in voeder verlaagd, wat een negatief effect kan hebben op de prestaties/darmgezondheid van biggen. Mag er extra koper in het water bijgedoseerd worden of moet er naar de totale koper-inname gekeken worden?](#)
- [Ik wil een stal voor vleesvarkens renoveren. Wat zijn de vereisten?](#)
- [Wat wordt er geadviseerd qua afmetingen bij de bouw van nieuwe kraamhokken?](#)
- [Wanneer is er voldoende verrijkmateriaal aanwezig? Wat zijn de voorwaarden van goed verrijkmateriaal?](#)
- [Voldoe ik door bietenpulp in te mengen in het rantsoen aan de bijkomende eisen voor verrijkmateriaal?](#)

Gezocht

Varkenshouders die groepsofok van biggen in de kraamstal willen toepassen

Groepsofok van biggen in de kraamstal kan een mogelijke oplossing zijn om de stress tijdens de kritische speenfase te reduceren. Kraamhokken worden hierbij vanaf een bepaalde leeftijd opengesteld zodat biggen van verschillende tomen voor spenen kunnen mengen. Onderzoek toonde aan dat groepsofok van biggen in de kraamstal de sociale ontwikkeling van de biggen en de speenovergang verbetert. Dit uit zich in minder agressief gedrag en bijgevolg minder huidbeschadigingen na spenen waardoor een betere voederopname de eerste dagen na spenen verwacht wordt.

Universiteit Gent is op zoek naar varkenshouders die het concept van groepsofok in de kraamstal bij een beperkt aantal tomen (10-tal tomen) willen toepassen, technische kengetallen willen opvolgen en hun mening en ervaring over dit concept willen delen.

Interesse om deel te nemen of wenst u meer info? Contacteer Céline Van Kerschaver:

celine.vankerschaver@ugent.be - 09/ 264 90 04 of 0470/ 42 81 18.

Demoprojecten

Technische benchmarking vleesvarkens


Via een demonstratieproject kunnen varkenshouders gedurende 2 jaar gratis de afzet van vleesvarkens vergelijken met collega's. Doel van het demoproject is om varkenshouders inzicht te geven in de werkwijze en criteria die slachthuizen hanteren om de karkaskwaliteit van vleesvarkens te bepalen. Dit gebeurt in verschillende stappen: 1) Individueel rapport per vracht te vergelijken met collega's (anoniem); 2) periodieke bespreking met collega's (in kleine groepjes) en 3) algemene informatie voor de sector (globale resultaten).

Deelnemen? Klik op de [link](#) of stuur een mailtje naar info@vpov.be.




Naam	KlopNr	Schema	Priktoestel	Slachterij	Slachtdatum	Weeknummer	Aantal varkens	Sekse
			AutoFOM III		12-9-2019	37	180	Borgen/Gelten

Resultaat 13,90 €/Vlv



Gewicht 2,84 €/Vlv



Te Licht 4 %

4

Te Zwaar 12 %

12

AFI 3,01



Europees Landbouwfonds
voor Plattelandsontwikkeling:

Europa investeert
in zijn platteland



In- en uitschrijven op deze mailing kan via het [Privacy Center](#)