

ZIEKTEVERSPREIDING OP JE VARKENSBEDRIJF VOORKOMEN...

... MET EEN OPTIMALE BESCHERMING VAN PASGEBOREN BIGGEN

BIEST IS LEVENSNODZAKELIJK

- Voorzie **minimum 160 g/kg LG biest** per big. De biestopname gebeurt het best **binnen 12 tot 24 uur** na de geboorte.
- Laat bij grote nesten de biggen alternerend zuigen.
- Leg een pasgeboren big onder de **lamp** of aan de uier.
- Geef de kleinste biggen de eerste dagen een **energiesupplement**.
- **Groep** de kleinste biggen na biestopname bij een zeug met goed bereikbare tepels (2e-3e worps).
- **Verdeel** de biggen over het beschikbare aantal tepels.



OMGEVING BEPAALT COMFORT

- Zorg voor een **droge** stal en **warme** biggen-nesten (32-35 °C).
- **Observeer** hoe de biggen zich gedragen. Pas indien nodig de hoogte van de lampen en de temperatuur van de vloerverwarming aan.
- Strooi een ontsmettend en opdrogend **poeder** over de pasgeboren, natte biggen.
- Hou voldoende **toezicht** bij de zeugen die werpen, maar respecteer de **rust** in de stal!

ZEUG DIE ZICH GOED VOELT, GEEFT VLOT MELK

- Bepaal de optimale **vaccinatiestrategie** voor een kwaliteitsvolle biest.
- Bescherm de (jonge) zeugen met een **stal-vaccin** op basis van de mest uit nesten met diarree.
- Zorg voor **gezonde zeugen** in goede conditie: spekdikte (18 mm eind dracht), ontwormd, schurftvrij, goed beenwerk en klauwen.
- Voorzie een optimaal **stalklimaat** (18-20 °C) voor een vlotte voeropname.
- Voorzie bacteriologisch zuiver **drinkwater** dat voldoet aan de chemische richtwaarden, met voldoende debiet (2-4 L/min) > www.dgz.be.



Bron foto's: Marc Wallican