

ZIEKTEVERSPREIDING OP JE VARKENSBEDRIJF VOORKOMEN...

... MET JUISTE VACCINATIEPRAKTIJKEN

VACCINS BEWAREN

- Berg de vaccins **onmiddellijk** op na levering.
- Hou de **temperatuur van de koelkast** op 3 tot 8 °C. Controleer dat met een thermometer.
- Plaats **geen vaccins in de deur** van de frigo.
- Koop niet **te veel vaccins** aan in verhouding tot het nodige aantal!
- **Gebruik levende vaccins onmiddellijk op na menging.** Je kan deze vaccins niet bewaren!



VACCINATIEMATERIAAL KIEZEN

- Gebruik **wegwerpnaalden**. Gebruik 1 naald per zeug, 1 per nest en 1 per 10 biggen.
- Vaccineer met **D3-naalden**. Die zijn opspoorbaar aan de slachtlijn.
- **Spoel de spuit regelmatig uit** met heet water.
- **Kies de juiste naaldlengte.**
 - Biggen in kraamhok 10 mm
 - Biggenafdeling 20 mm
 - Vleesvarkens 30 mm
 - Gelten 40 mm
 - Zeugen 40-50 mm
- Kies een naald met een **diameter tussen 0,8 en 1,1 mm**, afhankelijk van de viscositeit van het vaccin.



VACCIN TOEDIENEN

- Voorkom dat verschillende vaccins mengen. Gebruik **per vaccin aparte naalden en spuiten**.
- Vaccineer **geen zieke dieren**.
- Volg de **richtlijnen** van de fabrikant.
- **Dien het vaccin juist toe:**
 - **Intramusculair:**
 - naald loodrecht en horizontaal op huid;
 - een hand achter het oor bij zeugen;
 - twee vingers achter het oor bij biggen.
 - **Subcutaan:**
 - korte naald;
 - juist door de huid.
 - **Oraal:**
 - individueel drenchen;
 - drinkwaterbakjes.
 - **Intradermaal** eender waar op de huid, maar niet op haren; liefst op losse, zachte huid (bv. nek, achterhand).



Bron foto's: Marc Wallican